

**GUÍA DE CULTIVO**

Flowering Kale (Repollitos)

*Brassica oleracea***INFORMACIÓN DE CULTIVO**

Plantas anuales, de tallos simples de 50- 75 cm de altura  
Genéticamente las flores han sido mejoradas para ser compactas, sin embargo, el distanciamiento entre las plantas determina el tamaño de las flores.  
Los colores de la variedad Crane rojo y blanco son muy uniformes, de hábito erguido y complementa la variedad.  
La variedad Sunrise (color blanco-crema con centro rosado) y Sunset (rojo) se complementan entre sí y se comportan bien en arreglos florales.

**CARACTERÍSTICAS VARIETALES:**

**Varietad Crane:** White (blanco crema con centro rosado); Red (follaje verde oscuro con centro morado a rojo); Rose (follaje verde grisáceo con centro rojo a morado); Pink (follaje verde grisáceo con centro rosado).

**Varietad Sunrise** (blanco cremoso con centro rosado suave) Subset (centro rojo).

**GERMINACIÓN**

Bandejas Recomendadas	: 200 a 288 alvéolos
Temperatura de Germinación	: 21°- 24° C.
Días para Germinar	: 7- 10 días
Luz suplementaria	: No requiere
Tiempo de Almacigos	: 3 a 4 semanas
Época de siembra (hemisferio sur)	: Febrero a Julio

**PRODUCCIÓN**

Trasplante	: con 2 a 3 hojas verdaderas
Distanciamiento	: 15 cm con malla
Días para floración	: 90- 120 días
Temperatura	: 20 a 28°C inicialmente para la elongación del tallo, luego menos que 15°C para que desarrolle el color.

**RECOMENDACIONES DE CULTIVO**

Los Flowering son plantas de Día neutro, y las temperaturas bajas son necesarias para el desarrollo del color.

La malla de tutoraje es recomendada durante el cultivo, sino se pueden producir tallos curvos haciendo las plantas inutilizables para flores de corte.

Si las plantas son espaciadas a más de 15 cm. Puede producir cabezas muy grandes.

Cuando las plantas tienen 25 cm. De altura, las hojas inferiores pueden ser removidas. Esto podría repetirse 3 o 4 veces hasta para que la planta sea más alta.

Dar a las plantas adecuada fertilización, esta debe detenerse desde que las cabezas toman color. Las plantas debieran estar listas para la cosecha a mediados de noviembre.

Enfermedades comunes: Áfidos.

*Traducido desde [www.takii.com](http://www.takii.com) año 2011*