

GUÍA DE CULTIVO

Salvia Farinacea Evolution

Salvia farinacea

INFORMACIÓN DE CULTIVO



Ciclo de Vida:	Anual
Familia y Origen:	Lamiaceae, America (Texas)
Ubicación:	Pleno sol a sombra parcial
Altura de Jardín:	45 cm
Época de Floración:	Julio a octubre (hemisferio norte)
Tiempo de cultivo:	Tiempo de almácigos: 8-9 semanas. Floración en macetas: para floración de primavera 20-22 semanas. Para floración en verano; 12-16 semanas. Para producción de flor de corte: 16- 20 semanas.

Época de Siembra: Para hemisferio Norte: Diciembre a abril para floración en macetas de abril en adelante.

Método de siembra: 2-3 semillas por alveolo, puede sembrar directamente en la maceta recomendada, si tiene las condiciones adecuadas.

PRODUCCIÓN DE ALMÁCIGO

Germinación

El estado 1 y 2: 14- 24 días a temperaturas 18- 22° C. El estado 3 y 4: 21 días a 14- 16° C, en un sustrato con muy bajas sales solubles y pH de 5.5 – 6.5. Requiere luz para la germinación. No cubra la semilla. Mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. Evite la luz directa del sol, coloque sombra una vez ocurrida la germinación.

Crecimiento del almácigo:

Desde el estado 2, reduzca la humedad del suelo, pero no permita que el suelo se seque completamente. No deje que los niveles de salinidad suban por sobre 0,5 EC. Las raíces son muy sensibles a los altos niveles de sales. Comience a fertilizar a 50 ppm de Nitrógeno, con una fórmula bien balanceada. Durante el estado 3, y el estado 4 los niveles de fertilización pueden llegar a las 150- 200 ppm.

PRODUCCIÓN DE PLANTA TERMINADA

Crecimiento

2 a 3 semanas después de la siembra, trasplante 1 planta en una bandeja intermedia, de 4*4 y 3 a 4 semanas más tarde, trasplante a una maceta de 9- 12 cm y 3 plantas por contenedor en macetas de 3-5 litros.

Para cultivo de flores de corte plante a 25-30 * 25- 30 cm cuando se encuentre libre de heladas.

Sustrato

Utilice un sustrato con buen drenaje, con un 0-15% de arcilla y con un 0- 15% de fibra (corteza de pino, perlita, etc.). Agregue 1- 3 Kg/ m³ de un fertilizante bien balanceado y 0-2 kg/m³ de un fertilizante de liberación lenta (de 3- 6 meses); Quelatos de hierro, micronutrientes, y mantenga un pH de 5.5-6.5.

Temperatura

Cultive a 14- 16 ° C. Cuando los botones estén visibles, la temperatura debiera bajar a 14° C. La salvia farinácea no tolera heladas.

Fertilizantes

Requiere niveles moderados a altos de fertilización. Fertilice semanalmente con 200- 250 ppm de nitrógeno (a 0 kg/m³ de fertilizante de liberación lenta en el sustrato) Usando un fertilizante completo y bien balanceado. Las raíces son sensibles a altos niveles de sales en el sustrato. Evite altas concentraciones de fertilizante, es recomendable aumentar la frecuencia de fertilización para evitar altas concentraciones de sales.

Flor de Corte

Los tallos pueden ser cosechados cuando un 30% de la espiga esté abriendo. Retire las hojas de abajo y ponga las espigas en agua inmediatamente. La vida en florero es de 10- 14 días. El almacenamiento es frío es recomendado.

Nota:

Evite estrés de humedad, pues pueden causar hojas amarillas.

Nota: Los productores deberán utilizar la información presentada aquí como un punto de partida. El tiempo de cultivo varía dependiendo del clima, ubicación, época del año, y condiciones ambientales del cultivo.

La fertilización sólo sirve de guía. Es responsabilidad del productor leer y seguir todas las instrucciones de la etiqueta para cada producto específico.

Traducido por Ballchile desde www.benary.com 2012