Limonium Sinuatum Serie de TC

A. Apricot Butterscotch: Color crema durazno único
B. Strawberry Jam: Rosado fuerte fucsia
C. Super Purple: Morado oscuro
D. Snow White: Blanco puro
E. Luster Amathiste: Azul verdadero
F. Earth Pink: Rosado fuerte

- Nuevos colores en los clásicos "fillers" esenciales para bouquets, coursages y arreglos de flores
- Apropiado para la producción de flores en invernadero

Los nuevos Limoniums Sinuatas de cultivos de tejido combinan colores solidos y vibrantes con panículas grandes y horizontales.

Los Limonium Sinuatum hibridados en el Japon son apropiados para bouquets y ramos solidos.

Pueden secarse y aun asi mantienen su color intacto por un largo periodo de tiempo. Las mejores características son tallos fuertes de alta calidad, flores de colores brillantes, alta productividad y varios ciclos.

Adornadas con colores maravillosos, sus flores estan firmemente colocadas en los tallos. Esta serie es un "filler" esencial y fantástico para bouquets, coursages y otros arrgelos de flores.

Información Técnica
Limonium sinuatum

Ciclo: Perenne. 13 a 16 semanas a inicio de producción dependiendo de la variedad.

Densidad: 6 Plantas / m^2 neto(1 planta / ft2).

Pre-siembra

- **Suelo:** Bien drenado y suelto sin terrones. Por lo menos a 25 cm (10 pulgadas) de profundidad.
- **pH:** 5.0 a 6.0.
- **Malla:** Empiolar de acuerdo al crecimiento de la planta.

Despunte

Despunte suave cuando el primer tallo esta inducido.

Tener cuidado de no pinchar muy abajo porque los tallos pueden exponerse y pudrirse y causar problemas sanitarios.

Riego

Mantener humedad constante (Capacidad de campo) en las primeras 6 semanas.

Mantenga a 50% durante la producción.

Regar en la mañana preferiblemente para evitar la humedad en las plantas durante la noche.

Evite un riego excesivo.

Fertilización

Use: N: 100–120 ppm, K: 120-150 ppm,

Ca: 180–200 ppm.

Una fertilización excesiva resulta en panículas florales más pequeñas y menos ramos sólidos.

CE: 1.4.

Cosecha

Cosechar cuando el 60% de las flores estén abiertas.

Poscosecha

Agua limpia con un bactericida. (Chrysal Professional

2, 6 cc/lt) durante 12 horas en cuarto frío.

Empaque y Almacenamiento

Se empaca en ramos de 10 tallos, envueltos en papel, sin capuchón.

Se recomienda almacenar en seco para evitar problemas fitosanitarios por acumulación de humedad.

Plagas y Enfermedades

- Botrytis cinerea
- Mildeo velloso

cutflowers@ballhort.com

Ball™